

NOTES DE M. LIOUVILLE.

I.

Sur la limite vers laquelle tend l'expression $\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m$
lorsque m augmente indéfiniment.

1. Supposons d'abord que m soit un nombre entier positif. On a, par la formule du binôme démontrée dans les éléments,

$$\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m = 1 + \frac{m}{1} \frac{1}{m} + \frac{m(m-1)}{1.2} \frac{1}{m^2} + \frac{m(m-1)(m-2)}{1.2.3} \frac{1}{m^3} + \dots$$

$$\dots + \frac{1}{m^m}.$$

de sorte qu'en mettant le terme général

$$\frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{1.2\dots n} \frac{1}{m^n}$$

sous la forme

$$\frac{1}{1.2\dots n} \left(1 - \frac{1}{m}\right) \left(1 - \frac{2}{m}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{m}\right),$$

il vient

$$\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m = 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1.2} \left(1 - \frac{1}{m}\right) + \frac{1}{1.2.3} \left(1 - \frac{1}{m}\right) \left(1 - \frac{2}{m}\right) + \dots$$

$$\dots + \frac{1}{m^m}.$$

Le nombre des termes du second membre augmente quand m augmente; et, sauf les deux premiers termes qui restent fixes, chaque terme d'un rang donné augmente aussi: la valeur du second membre augmente en conséquence, mais sans pourtant jamais dépasser la somme

$$1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1.2} + \frac{1}{1.2.3} + \frac{1}{1.2.3.4} + \dots + \frac{1}{1.2\dots m},$$

ni *a fortiori* la somme

$$1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{m-1}},$$

visiblement comprise elle-même entre 2 et 3. Donc enfin $\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m$ tend vers une certaine limite, plus grande que 2, plus petite que 3, et que nous désignerons par e .

2. Maintenant, si l'on observe que l'expression

$$\frac{1}{1.2\dots n} + \frac{1}{1.2\dots n(n+1)} + \dots + \frac{1}{1.2\dots m},$$

où n désigne un nombre entier positif quelconque moindre que m , est plus petite que

$$\frac{1}{1.2\dots n} \left(1 + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(n+1)^{m-n}} \right),$$

et partant moindre que

$$\frac{1}{1.2\dots n} \frac{1}{1 - \frac{1}{n+1}} = \frac{1}{1.2\dots n} \left(1 + \frac{1}{n} \right),$$

on verra que l'on peut poser

$$\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m < 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1.2} + \dots + \frac{1}{1.2\dots(n-1)} + \frac{1}{1.2\dots n} \left(1 + \frac{1}{n}\right),$$

inégalité qui devra subsister, quelque grand qu'on fasse m , en laissant n fixe, après avoir donné à n une valeur à volonté. On en conclut, à la limite :

$$e < 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1.2} + \frac{1}{1.2.3} + \dots + \frac{1}{1.2\dots(n-1)} + \frac{1}{1.2\dots n} \left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

Mais, d'un autre côté, la formule

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m &= 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1.2} \left(1 - \frac{1}{m}\right) + \dots \\ &\dots + \frac{1}{1.2\dots n} \left(1 - \frac{1}{m}\right) \left(1 - \frac{2}{m}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{m}\right) + \dots + \frac{1}{m^m} \end{aligned}$$

nous donne

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m &> 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1.2} \left(1 - \frac{1}{m}\right) + \frac{1}{1.2.3} \left(1 - \frac{1}{m}\right) \left(1 - \frac{2}{m}\right) + \dots \\ &\dots + \frac{1}{1.2\dots n} \left(1 - \frac{1}{m}\right) \left(1 - \frac{2}{m}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{m}\right). \end{aligned}$$

Cette fois encore, laissons n fixe et faisons grandir m à l'infini. Le second membre tendra vers la limite

$$1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1.2} + \frac{1}{1.2.3} + \dots + \frac{1}{1.2\dots n},$$

et le premier vers la limite e . On a donc

$$e > 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1.2} + \frac{1}{1.2.3} + \dots + \frac{1}{1.2\dots n}.$$

Les deux expressions entre lesquelles le nombre e se trouve compris ne diffèrent entre elles que par le terme

$$\frac{1}{1.2\dots n} \cdot \frac{1}{n},$$

qu'on rend aussi petit qu'on veut, en prenant n grand : elles permettent de calculer la valeur 2,718.... de e avec toute l'approximation qu'on voudra.

3. Soit à présent m positif, sans être un entier; et je dis que $\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m$, quand m grandira indéfiniment, tendra encore vers la limite e . Car soient $p, p+1$ les deux entiers successifs entre lesquels m est compris, et qui grandissent comme lui à l'infini : on aura

$$\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m > \left(1 + \frac{1}{p+1}\right)^p$$

et

$$\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m < \left(1 + \frac{1}{p}\right)^{p+1}.$$

Or les seconds membres de ces deux inégalités peuvent s'écrire respectivement

$$\left(1 + \frac{1}{p+1}\right)^{p+1} : \left(1 + \frac{1}{p+1}\right)$$

et

$$\left(1 + \frac{1}{p}\right)^p \left(1 + \frac{1}{p}\right);$$

quand p augmente à l'infini, ils tendent vers la limite commune e . Donc $\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m$ tend aussi vers cette limite.

4. Enfin, soit m négatif et $= -q$. On a

$$\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m = \left(1 - \frac{1}{q}\right)^{-q} = \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{q}}\right)^q,$$

d'où

$$\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m = \left(\frac{q}{q-1}\right)^q = \left(1 + \frac{1}{q-1}\right)^{q-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{q-1}\right);$$

et l'on retrouve encore pour q infini la limite e .